



Verwendungsart:

Erwachsene über 18 Jahre: 50 ml täglich zu einer Mahlzeit. Es wird empfohlen, ein zusätzliches Glas Wasser oder ein anderes Getränk dazu zu trinken. Die empfohlene maximale Tagesmenge sollte nicht überschritten werden. Das Produkt sollte immer mit ausreichend Flüssigkeit eingenommen werden, da eine unzureichende Flüssigkeitsaufnahme zu Verstopfung führen kann.

Zwischen der Medikamenteneinnahme und der Aufnahme von Ballaststoffen sollte ein ABSTAND eingehalten werden, da ballaststoffreiche Lebensmittel die Aufnahme von Medikamenten aus dem Magen-Darm-Trakt verringern können.

Die Einnahme von Medikamenten wird 1 Stunde vor oder mindestens 2 Stunden nach der Aufnahme von Ballaststoffen empfohlen.

Lagerung:

Bei Raumtemperatur und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 30 Tagen verbrauchen. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Da Nahrungsergänzungsmittel DuoLife ein natürliches Erzeugnis ist, können Geschmack und Konsistenz jeweiliger Chargen unterschiedlich sein, je nach Jahreszeit und Rohstoffen, die zur Herstellung verbraucht wurden. Etwaiges Sediment entsteht aus natürlichen Zutaten und ist typisch für solche Erzeugnisse. Um das Sediment zu entfernen, vor dem Gebrauch schütteln.

Vorsichtsmaßnahmen:

Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe des Produkts. Bei chronischen Krankheiten und der Einnahme von Medikamenten konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie das Produkt verwenden. Verwenden Sie das Produkt nicht bei Personen unter 18 Jahren, schwangeren und stillenden Frauen.