



Verwendungsart:

Erwachsene und Kinder über 12 Jahre: 1-2 Beutel täglich, in Speisen oder Getränke gießen und gut mischen. Direkt nach der Zubereitung verbrauchen. Es wird empfohlen, ein zusätzliches Glas Wasser oder ein anderes Getränk zu trinken. Die empfohlene maximale Tagesmenge sollte nicht überschritten werden.

Kinder von 6 bis 12 Jahren sowie schwangere und stillende Frauen: Die Verwendung des Produkts ist nach vorheriger Absprache mit einem Arzt gestattet. Es wird empfohlen, 1/4-1 Beutel pro Tag einzunehmen, je nach Alter des Empfängers und den Empfehlungen des Arztes.

Produkt nicht für Kinder unter 6 Jahren bestimmt.

Das Produkt sollte immer mit ausreichend Flüssigkeit eingenommen werden, da eine unzureichende Flüssigkeitsaufnahme zu Verstopfung führen kann.

Zwischen der Medikamenteneinnahme und der Aufnahme von Ballaststoffen sollte ein Abstand eingehalten werden, da ballaststoffreiche Lebensmittel die Aufnahme von Medikamenten aus dem Magen-Darm-Trakt verringern können.

Die Einnahme von Medikamenten wird 1 Stunde vor oder mindestens 2 Stunden nach der Aufnahme von Ballaststoffen empfohlen.

Das Produkt kann z. B. zum Binden von Suppen oder Saucen und zum Backen verwendet werden.

Lagerung:

Bei Raumtemperatur und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Vorsichtsmaßnahmen:

Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe des Produkts. Vorsicht ist geboten bei älteren Patienten mit Schluckbeschwerden. Bei bestehenden chronischen Erkrankungen sowie bei der Einnahme von Medikamenten konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie das Produkt einnehmen. Nicht bei Kindern unter 6 Jahren anwenden.